



Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Ветеринарный центр»


АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ)

г. Ханты-Мансийск

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Африканская чума свиней (АЧС) является смертельно опасным заболеванием и вызывается особо жизнестойким вирусом, который в результате попадания в организм свиньи моментально размножается и поражает свиное поголовье.

АЧС — вызывает у свиней лихорадку, геморрагический диатез, воспалительные процессы и некроз внутренних органов.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ: ПРИЧИНЫ И ТЕЧЕНИЕ

ВОЗБУДИТЕЛЬ



Вирус семейства
Asfarviridae
рода *Asfivirus*



Может сохраняться на протяжении нескольких месяцев в продуктах свиного происхождения, не подвергнутых термической обработке



Устойчив к влиянию окружающей среды

ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ



При молниеносном течении болезни животные гибнут без каких-либо признаков

При остром течении болезни наблюдаются следующие симптомы



Больные животные большую часть времени лежат, вяло поднимаются и быстро устают

Слизисто-гнойные выделения из носа и глаз

Появляется сильная жажда

Одышка

Кашель

Приступы рвоты

Повышение температуры тела до 40,5 — 42,0 °C
На нежных участках кожи могут появиться гнойные волдыри, на месте которых образуются струпа и язвы

На коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они не бледнеют

У больных животных раскручивается хвост

Иногда понос с кровью, чаще запор

Слабость и параличи задних конечностей, шаткая походка



Смертность, в зависимости от течения, может достигать от 50 до 100 процентов. Переболевшие и оставшиеся в живых животные становятся пожизненными вирусоносителями

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ



Выделения больных животных



Использование в корм необезвреженных столовых отходов



Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, кожные паразиты

ПРИЧИНЫ И ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ: ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

БОРЬБА



Поголовье свиней в очаге заболевания полностью ликвидируют бескровным способом



Трупы свиней, навоз, остатки корма, малоценные предметы ухода сжигают. Зола закапывают в ямы, смешивая ее с известью



Помещения и территории ферм дезинфицируют горячим 3-процентным раствором едкого натрия и 2-процентным раствором формальдегида



На расстоянии 10 километров вокруг неблагополучного пункта все свиноголовье убивают, а мясо перерабатывают на консервы



Карантин снимают через 6 месяцев с момента последнего случая падежа, а разведение свиней разрешают не ранее чем через год после снятия карантина



ПРОФИЛАКТИКА



Не допускать свободного выгула свиней на территории населенных пунктов, особенно в лесной зоне



Ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых, постоянно вести борьбу с грызунами



Не использовать необезвреженные корма животного происхождения



Ограничить связи с неблагополучными территориями



ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРОФИЛАКТИКА АЧС

РЕКОМЕНДАЦИИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АЧС



РЕКОМЕНДАЦИИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ !



Будьте бдительны при содержании и разведении свиней, приобретении продукции свиноводства!

Заболевание легче предупредить, чем ликвидировать последствия!

В случае подозрения, обнаружения признаков африканской чумы свиней, некачественной продукции свиноводства, несанкционированного ввоза свиней, свиной продукции немедленно обращайтесь к ветеринарным специалистам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ветеринарный центр»____, территориальные органы госветнадзора____.



ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ ЮГРЫ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!